


PRIMARIA COMUNEI POPEȘTI
JUDETUL IASI

Nr. /19.06.2025

Comportamentul de asistență socială



VIZAT
PRIMAR LUPU VASILE



INFORMARE¹

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI POPEȘTI, JUD. IAȘI

Informare cu privire la consumul de droguri (aspecte de legislative, riscuri, măsuri de prim ajutor)

1. Termeni de bază

Drogul – este substanța licită sau ilicită al cărei consum (din motive medicale sau din alte motive) determină fenomene de dependență și toleranță. Ex: alcoolul, tutunul, tranchilizantele, amfetaminele, cannabis, cocaina, opiul și derivații săi, methadona, LSD, solvenții.

Dependența – este fenomenul caracterizat prin nevoia imperioasă sau persistentă de a continua utilizarea drogului, ignorând consecințele în plan fizic, psihologic și social, în scopul obținerii unei stări de bine sau pentru a evita starea de disconfort generată de întreruperea consumului substanței respective.

Toleranța – este fenomenul de adaptare a organismului consumatorului la prezența unei substanțe denumite generic „drog”.

Sevrajul – denumit și „sindrom de abstenență” reprezintă un ansamblu de simptome fizice și psihice ce apare la întreruperea administrării unei substanțe psihoactive, la administrarea unei doze insuficiente sau după administrarea unui medicament cu proprietăți antagoniste.

2. Aspecte de ordin legislativ

Sanționarea traficului și a altor operațiuni ilicite cu substanțe aflate sub control național este prevăzută în Legea Nr.143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri:

- Art. 2 (alin. 1) – Faptele precum cultivarea, producerea, fabricarea, vânzarea, transportul sau deținerea de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.
- Art. 2 (alin. 2) – Dacă faptele au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este tot între 3 și 15 ani, dar cu un regim mai sever.

¹ Sursa informațiilor: <https://nt.politiaromana.ro/ro/utile/sfaturi-utile/drogul-pericol-pentru-toti>

- **Art. 4** – Cultivarea sau deținerea pentru consum propriu se pedepsește cu **2 la 5 ani de închisoare**.
- **Art. 5** – Punerea la dispoziție a unui loc pentru consum ilicit se pedepsește cu **3 la 10 ani** și interzicerea unor drepturi.
- **Art. 15** – Persoanele care denunță participarea la comiterea de infracțiuni înainte de începerea urmăririi penale nu sunt pedepsite.
- **Art. 16** – Colaborarea în timpul anchetei duce la reducerea cu **jumătate a pedepsei**.
- **Art. 17** – Drogurile și bunurile obținute se confiscă; în lipsa lor, condamnatul este obligat la plata echivalentului în bani.

3. Dependența de droguri în România

În România, media de vârstă a consumatorilor a scăzut la **15 ani**, ceea ce stârnește îngrijorare în rândul părinților.

Studiu ESPAD 2003

Realizat de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Cercetare, a arătat:

- **64%** dintre elevii de 16 ani au consumat tutun;
- **80%** alcool;
- Consumul de **amfetamine** s-a dublat;
- Consumul de **ecstasy** s-a triplat față de 1999;
- Aproximativ **24.000 de consumatori de heroină** în București.

Tinerii nu mai disting clar între consumul de tutun, alcool și droguri ușoare, deși toate pot avea consecințe legale și grave asupra sănătății.

4. Riscurile consumului de droguri

- **Alcoolul, heroina, tranchilizantele** – depresive; induc somnolență, afectează coordonarea, cauzează sevraj.
- **Amfetaminele, cocaina, ecstasy** – stimulente; pot provoca crize fatale, mai ales la persoane cu probleme de tensiune.
- **LSD** – halucinogen; provoacă iluzii, tulburări de comportament, reacții imprevizibile.

5. Depistarea consumatorilor

Semne frecvente ale consumului:

- Schimbări bruște de dispoziție și comportament;
- Scăderea interesului pentru școală sau activități;
- Somnolență necaracteristică, oboseală inexplicabilă;
- Cheltuieli mari, obiecte lipsă din casă;
- Mirosurile stranii, pete pe piele sau haine;
- Grupuri noi de prieteni și limbaj diferit.

6. Măsuri de prim ajutor

În caz de halucinații, panică sau consum de stimulente:

- Izolarea de zgomot și lumini;
- Comunicare calmă, respirații profunde;
- Identificarea tipului de drog consumat.

În caz de deshidratare: Odihnă, sucuri, gustări sărate și hidratare cu lichide nealcoolice – aproximativ jumătate de litru pe oră.

7. Dacă persoana își pierde starea de conștiință

- Primul lucru pe care trebuie să-l facă salvatorul este să se **asigure că persoana leșinată respiră normal**. Dacă respirația nu este perceptibilă, se va administra **respirație gură la gură**.
- În scop preventiv, pentru a nu-și înghiți limba sau, în caz de vărsături, să nu se sufocă, **persoana inconștientă trebuie poziționată culcată pe-o parte**, cu genunchiul ușor îndoit, **capul întors lateral**, iar brațele flexate de-o parte și de alta a capului.
- La sosirea ambulanței, se vor oferi **toate informațiile disponibile** privind:
 - ce substanțe a consumat persoana;
 - momentul consumului;
 - iar dacă nu se cunosc aceste detalii, **se vor menționa recipientele sau pulberile găsite lângă ea**. Aceste informații pot fi esențiale pentru ca personalul medical să stabilească rapid **cel mai bun antidot**.

Compartimentul de asistență socială,
Consilier superior, Păriu Dennis-Theodor

